OÙ SE FORMER ?

La formation IPSEN est une initiation qui sensibilise les participants à la prévention des accidents domestiques et de la vie courante et propose un apprentissage des gestes de premiers secours de l'enfant et du nourrisson.
Durée : 4h30

Le coût de la formation est de 35€. (Le prix peut être soumis à variation en fonction des charges de la structure).

L'argent des formations permet notamment de financer les activités de la structure locale comme l'achat du matériel pédagogique et la formation des formateurs bénévoles.

Pour vous inscrire , veuillez flasher le QR-Code ci-dessous:

Ateliers 1er secours animés par Marine ARCHAMBAUD :
Contact : marine.archambaud@orange.fr



NUMÉROS D'URGENCE À CONNAITRE





MSP BÉNOVIE
40 rue Souvielle - 34160 - Boisseron

mspbenovie34@outlook.fr

INITIATION 1ER SECOURS ENFANTS & NOURRISSONS



En France, chaque année, les accidents de la vie courante, les AcVc, sont de plus en plus nombreux. l'INPES, indiquent que plus de 20 000 décès ont lieu par an à cause d'un AcVc et que ces accidents de la vie courante représentent la première cause de mortalité chez les petits âgés de 1 an à 4 ans.

Chez les tout-petits, l'Institut de Veille Sanitaire, l'InVs, souligne que ces accidents de la vie courante représentent 12 % des décès durant la première année de vie.

SE FORMER POUR RÉPONDRE À QUELS RISQUES ?



Les écrasements par mobilier:

Alors que le tout-petit ne sait pas encore marcher, ou fait tout juste ses premiers pas, il a tendance à s'agripper aux meubles et aime les escalader pour se hisser dessus. La chute d'un téléviseur, ou d'un meuble mal fixé ou peu stable, provoque des lésions et traumatismes sérieux, souvent localisés au niveau de la tête et du cou de l'enfant.

Les brûlures:

Les brûlures électriques sont les plus fréquentes (50 à 80 % des cas). L'enfant met son doigt dans le trou d'une prise de courant ou encore porte à sa bouche un fil dénudé. Ces accidents domestiques sont graves et exposent le tout-petit à un risque de détresse respiratoire. Les brûlures dues par un bain trop chaud ou un liquide bouillant renversé par mégarde, alors que l'enfant se tient dans les bras d'un adulte ou tire sur une nappe, peuvent occasionner des séquelles fonctionnelles et esthétiques importantes.



Les intoxications:

Une intoxication après une ingestion de médicaments ou de produits ménagers est une cause fréquente d'accident domestique. La gravité de l'intoxication varie dans ce cas selon la nature du médicament ou produit avalé.

Les asphyxies et étranglements :

D'après un rapport de l'InVs de 2012, elles sont les 1ères causes de décès accidentel chez l'enfant de moins de 1 an. La mort subite du nourrisson touche près de 250 enfants chaque année en France : de mauvaises conditions de couchage et une literie inadaptée peuvent être responsables d'une asphyxie et du décès soudain du nourrisson. Le port d'un collier, s'il se coince à un barreau de son lit ou une autre partie du mobilier, peut provoquer un étouffement du tout-petit. De même, une ingestion accidentelle de petits objets ou aliments (billes, cacahouètes, noyau de fruit, etc.) peut aussi entrainer une asphyxie ou un étranglement nécessitant des secours d'urgence.

Les noyades:

Les noyades en baignoire sont malheureusement très fréquentes chez les tout-petits, d'autant plus lorsque l'on a recours à un siège ou anneau de bain qui demandent une quantité d'eau plus importante et offrent un faux sentiment de sécurité. L'été, les noyades en piscine provoquent également des dizaines de décès chaque année, essentiellement en raison d'un défaut de surveillance.

Les chutes:

Elles représentent le taux le plus élevé des lésions chez le nourrisson. Les chutes des bras d'un adulte, d'un mobilier (table à langer, canapé, lit parental, etc.) ou encore d'une chaise haute, d'un escalier ou d'un siège auto entrainent de graves traumatismes : fractures du crâne, contusions ou plaies du cuir chevelu.



OBJECTIFS DE LA FORMATION :



Savoir réagir en cas d'urgence.

- Prévention des accidents de la vie courante
- La protection
- L'alerte
- L'enfant qui s'étouffe
- Le bébé qui s'étouffe
- Le nourrisson et l'enfant saignent abondamment
- Le nourrisson et l'enfant perdent connaissance
- L'enfant ou le nourrisson ne respire pas
- Maîtriser les gestes adaptés aux bébés (ex. PLS pédiatrique, désobstruction des voies aériennes).

Prévenir les accidents domestiques.

* Prévention des risques d'asphyxie: Couchez l'enfant sur le dos sur un matelas ferme; Évitez les aliments à risque comme les cacahuètes et les morceaux trop gros.

* Prévention des risques de noyade : Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le bain, même pour quelques secondes.

* Prévention des risques de chute: Gardez une main sur l'enfant lors du change sur la table à langer. Assurez-vous que l'enfant est bien attaché dans sa chaise haute. Installez une barrière de sécurité pour les escaliers.

* Prévention des risques d'écrasement: Stabilisez et fixez les meubles pour éviter qu'ils ne tombent sur l'enfant.

* Prévention des risques de brûlures: Tournez les poignées de casseroles vers l'intérieur. Évitez les nappes sur les tables. Vérifiez la température du bain (entre 35 et 37 °C). Utilisez des cache-prises et rangez les rallonges.

* Prévention des risques d'intoxication : Rangez les produits ménagers et médicaments en hauteur; Ne laissez pas les produits dangereux à la vue de l'enfant.

Consultez un médecin après tout accident, même léger. En cas d'accident grave, contactez immédiatement les secours.